

Préparations africaines

Parties utilisées	Préparations	Posologie	Parasites	Pays
Graines	Poudre des graines séchée	1 à 2,5 grammes par jour pour un adulte.	vers intestinaux et amibiases	Burkina Faso
	Poudre de graines séchées en infusion		ascaris, ténia	
	Les graines sont introduites dans l'alimentation		Parasites intestinaux	Guinée
	Les graines entières sont directement ingérées		Parasites intestinaux	Guinée, Ghana, Sénégal, Éthiopie
	Graines de Carica papaya, VO. + purge à l'huile de ricin		Ascaris, oxyures, helminthiases	Madagascar
	Les graines écrasée de papaye mure sont intégrées dans la bouillie du matin et du soir		Parasites intestinaux	Togo
	Décoction de graines dans de l'eau		Parasites intestinaux	Burundi, Nigeria
	Décoction de poudre de graines dans de l'eau	1 cuillère à soupe dans la bouillie du matin (sans sucre), durant 4 jours (enfant 1 cuillère à café)	Parasites intestinaux	Bénin
	Graines pilées dans de l'eau ou en décoction		Parasites intestinaux	Burundi
	Graines + eau ou lait, le matin	20 graines	Parasites intestinaux	Réunion
Graine et bulbe d'oignon	Piler 1/2 verre de graines de Carica papaya de 5 bulbes de Allium cepa + miel, VO.		Parasites intestinaux	Cameroun
Latex	Latex du fruit immature en voie orale	3 cuillères à café pour adultes sinon doses adaptées	Parasites intestinaux	RDC
	Latex du fruit immature en voie orale	8 à 10 gr de latex frais pour les enfants, le double pour les adultes	Oxyure, trichocéphalose vers parasites	Cameroun
	Latex en voie orale		Oxyures	Mali
	latex délayé		Parasites intestinaux	RDC
	latex de papayer male + eau sucrée à boire le soir	3 gouttes de latex	Parasites intestinaux	Réunion
Fruit	Jus fruit vert		Parasites intestinaux	Nigeria, Comores
	Fruit frais + miel ou sirop		Parasites intestinaux	Madagascar
	Consommer régulièrement de la papaye verte contribue à se prémunir des parasites.		Parasites intestinaux	Burkina Fass

Feuilles	feuilles pilées dans un récipient, bain de siège (enfant)		Helminthiase	Angola
	décoction de feuilles dans de l'eau à boire à jeun		Parasites intestinaux	
	2 poignées de feuilles lavées de <i>Psyidium guayava</i> (ipera), <i>Euphorbia hirta</i> (mpangula ntazi), <i>Carica papaya</i> (ipapayi) + mbidu (non déterminé), bouillir dans 2l H ₂ O durant 15 minutes	½ verre, 3X / J. durant 5 à 7 J.	Parasites intestinaux	Sud Kivu (Bukavu)
	La décoctions de feuilles en usage interne peut être utilisées comme stimulant digestif.	30 grammes par litre d'eau		Burkina Faso
Feuilles et latex	extrait de feuilles et latex de fruits mûrs en voie orale		Parasites intestinaux	Nigeria
Racine	racines fraîches écrasées et homogénéisées dans de l'eau		Parasites intestinaux	Ethiopie
Racine et graine	décoction de graines et de racines		Helminthiase	Île Rodrigues, Angola
Fleur	Macération de fleurs males dans 1/4 de litre d'eau,	Boire une fois par jour pendant trois jours	Parasites intestinaux	Réunion
	fleurs de <i>Carica papaya</i> + <i>Ageratum conyzoides</i> ou + <i>Portulaca oleracea</i> ou + <i>Ocimum canum</i> ou + <i>Heliotropium arborescens</i> ou + <i>Pelargonium asperum</i>	Non indiquée	Parasites intestinaux	Réunion